



À PARTIR DE LA
4^{ÈME} SEMAINE
SUIVANT LA
CHIRURGIE

JÉJUNOSTOMIE

BROCHURE NUTRITION PATIENT

Impact de l'alimentation

Le tube digestif est un organe destiné à l'absorption des **aliments, des vitamines, des minéraux et de l'eau.**

Du fait de l'existence de la **stomie en début d'intestin,** l'absorption est réduite entraînant des débits de stomie élevés et donc un risque de malnutrition.

De plus, certaines catégories d'aliments ou de boissons **irritent l'intestin grêle** augmentant encore le débit dans les poches.

Les seuls aliments ayant une capacité optimale d'absorption sont les féculents.

Ils sont aussi notre apport essentiel en énergie.



The diagram illustrates the human digestive system within a white outline of a human torso. The esophagus is shown as a vertical tube leading to the stomach. The small intestine is depicted as a long, coiled tube originating from the stomach. A tube, representing a jejunostomy, is inserted into the jejunum (the middle part of the small intestine) and extends upwards through the neck to the mouth. The large intestine is shown as a larger, more complexly coiled structure below the small intestine. A purple rectangular box with the text 'Jéjunostomie' is positioned to the left of the jejunum, with a thin white line pointing from the text to the tube's insertion point in the small intestine.

Jéjunostomie

UNE ALIMENTATION ADAPTÉE

ALIMENTS AUTORISÉS



Féculents

- Pain
- Pommes de terre
- Céréales, riz, pâtes, semoule (non complets), quinoa, boulgour

Protéines

- Poisson
- Viande
- Œufs
- Jambon



Légumes cuits

- Ne sont pas nécessaires mais pas interdits

Sauces

- Pour agrémenter vos plats



Notes :

ALIMENTS À ÉVITER

Certains féculents

- Maïs
- Pain complet
- Céréales complètes
- Excès de légumineuses (lentilles, petits pois, pois chiches, haricots)



Boissons et aliments irritants

- Lait et laitages (yaourt, fromage blanc)
- Excès de fruits et légumes crus
- Thés et tisanes
- Eaux et sodas pétillants

Certaines sauces

- Éviter les sauces piquantes ou à base de crème



Notes :

UNE JOURNÉE ÉQUILBRÉE TYPE

À partir de la 4^{ème} semaine suivant la chirurgie

PETIT DÉJEUNER

Boisson + pain avec +/- beurre +/- confiture ou miel



DÉJEUNER

Féculents (moitié de l'assiette minimum) + protéine + fromage ou compote



Notes :

DÎNER

Féculents (moitié de l'assiette minimum) + protéine + fromage ou compote



+/- COLLATION matin et/ou après-midi

Pain avec... (beurre, confiture, chocolat ou fromage)



Notes :

Dr Philippe FAUQUÉ
Institut Polyclinique de Cannes

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photo non contractuels.

B. BRAUN MEDICAL | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud France |
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr | Société par
actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856
ZB30002 - édition 01/2020